

# Phá thai bằng thuốc có ảnh hưởng gì không? Những điều cần lưu ý

## Phá thai bằng thuốc có ảnh hưởng gì không? Những điều cần lưu ý

Bỏ thai bằng thuốc là biện pháp kết thúc thời kỳ mang thai được không ít cơ thể chọn lựa lúc mang thai phía ngoài mong muốn. Tuy nhiên, việc tự ý uống thuốc bỏ thai ngay tại nhà không bởi kiểm tra cùng với chỉ dẫn của bác sĩ y khoa có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm đến tính mệnh, và sức khỏe sinh con của cơ thể phái đẹp.

Lưu ý: một số thông tin chia sẻ trong bài viết này chỉ mang tính vận dụng, không thay cho vấn đề kiểm tra, kết luận cũng như chỉ định chữa y tế. Chị em tuyệt đối không tự tiện dùng thuốc bỏ thai tại gia. Nên xét nghiệm thẳng, Nói chuyện với bác sĩ phụ khoa nhằm được hướng dẫn phác đồ khoa học.

## Phá thai nội khoa là gì?

Phá thai bằng cách uống thuốc là chấm dứt một thời kỳ mang thai bằng giải pháp bằng thuốc, có nghĩa là dùng thuốc để gây sảy thai. Chuyên gia Hồ Thị Khánh Quyên cho thấy, theo quy ước phá thai nội khoa xem là thành quả lúc sảy thai tận gốc mà không nên can thiệp bất kỳ thủ thuật nào truy cập buồng dạ con, nhờ vậy giảm được nguy cơ nhiễm trùng cùng với thủng tử cung. (1)

## Cơ chế vận động của thuốc bỏ thai

Liệu có 2 kiểu thuốc được lấy trong quy trình phá thai bằng thuốc, đó là: Mifepristone 200mg( Mifestad 200mg), Misoprostol 200mcg.

Mifepristone 200mg thì có tác dụng khiến ngừng việc tiến triển của thai nhi. Misoprostol có công dụng gây nên tụt bóp tử cung để đẩy phôi thai ra khỏi dạ con.

Rất nhiều nữ giới lầm nghĩ rằng thuốc bỏ thai là thuốc tránh thai cấp bách, sử dụng 10-20 viên thuốc tránh thai cấp bách sẽ cộng dồn đầy đủ liều sẽ

liệu có công dụng như thuốc bỏ thai. Bác sĩ chuyên khoa Khánh Uyên chia sẻ, thuốc Mifestad 10mg là thuốc tránh thai cấp bách và thuốc Mifestad 200mg là thuốc được sử dụng trong phác đồ phá thai bằng thuốc. Vì vậy không nên lấy thuốc phòng tránh thai khẩn cấp để phá thai.

- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868635>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868633>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868624>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868614>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868610>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868605>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868608>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868576>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868572>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/867613>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868341>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868349>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868359>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868367>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868385>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868496>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868517>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868531>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868551>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868548>

“Thuốc ngừa thai khẩn cấp được sản sinh để tránh thai cấp bách, không được thống kê cộng dồn liều số lượng nhằm thì có chức năng. Nếu như dùng quá liều thuốc tránh thai cấp bách sẽ có khả năng thấy một số tác dụng phụ như sốt, mót nôn, ón lạnh, ỉa chảy, rét run... Trong tình huống có công dụng bỏ thai Đi chẳng nữa cũng đều tiềm ẩn khả năng biến chứng vì không được để ý y khoa”, bác sĩ Khánh Quyên nhấn mạnh.

## **Tại vì sao cần phải sử dụng thuốc phá thai?**

Trong tình huống buộc chấm dứt thai kỳ, bỏ thai bằng thuốc được ưu tiên chọn lựa vì đây là cách được nhận xét dùng biện pháp bảo vệ cùng với nhanh chóng. Phác đồ tiến hành sớm lựa chọn, tỷ lệ thành tựu dài, phụ nữ không cần tọa lạc viện hoặc lấy những kiểu thuốc dẫn đến mê, dẫn tới tê. Đặc biệt, Nếu mà uống thuốc bỏ thai thành công, chị em không nên can thiệp bất kỳ 1 phẫu thuật nào trong lòng dạ con, nhờ vậy hạn chế được những nguy cơ viêm nhiễm hoặc tổn thương lòng tử cung. (2)

Không nên của cách này là nữ cần phải tái khám nhiều lần nhằm thăm khám tình trạng ra thai. Nữ có thể bị đau đốn bụng hay ra huyết âm đạo kéo dài hơn so với những phương pháp không giống. Nếu như phá thai bằng cách uống thuốc bất thành, phụ nữ nhất thiết can thiệp tiểu phẫu nhằm lấy thai ra bên ngoài. Mặt khác, không cần phải trường hợp nào cũng có nguy cơ sử dụng giải pháp này.

## **Chỉ định uống thuốc phá thai trong trường hợp nào?**

Chuyên gia Khánh Quyên cho thấy, bỏ thai bằng vấn đề sử dụng thuốc thường được ưu tiên chỉ định trong các trường hợp như mang bầu ngoài ý muốn (bị cưỡng dâm, hai vợ chồng dùng giải pháp tránh thai không hiệu quả...), hay cơ thể mẹ chứa căn bệnh không thể mang thai, hoặc thai nhi thì có căn bệnh. (3)

Độ tuổi thai được chỉ dẫn sử dụng thuốc bỏ thai là tầm khoảng 4-7 tuần (tính theo số ngày hoặc số tuần Khoảng ngày trước tiên của kỳ kinh chung cục tới lúc quyết định phá thai hay theo siêu âm). Song, ở độ tuổi thai lớn hơn vẫn có thể lấy song số trường hợp thành tựu thấp, hay bắt buộc phải thì có phối hợp can thiệp thủ thuật mới cho số trường hợp thành công nhiều hơn.

Cần phải chú ý, thuốc phòng tránh thai được khuyến cáo chống chỉ định chẩn đoán những tình huống sau:

- Cơ thể nhiễm bệnh lý tim mạch như hẹp van hai lá, có tiền sử tắc tĩnh mạch hoặc mắc tắc mạch;
- Cơ thể thì có bệnh lý tuyến thượng thận hoặc rối loạn đông máu;
- Cơ thể bị mất máu ở cấp độ bình quân hoặc nặng;
- Người dị ứng đối với những đối tượng liệu có trong thuốc bỏ thai.

## Một số kiểu thuốc phá thai hay bất gặp

Ngày nay thì có hai dạng thuốc bỏ thai được kết hợp sử dụng để kết thúc thời kỳ mang thai là Mifestad cũng như Misoprostol. Hai kiểu thuốc này đã được Cục Quản lý thức ăn cũng như Dược phẩm Mỹ (Food and Drug Administration – FDA) phê chuẩn để kết thúc thời kỳ thai nghén.

- Mifestad: Là kiểu thuốc được sử dụng trước hết đối với tác dụng làm thai ngưng phát triển, Đồng thời giúp cho thai bong ra đỡ lòng tử cung nhanh hơn.
- Misoprostol: dạng thuốc được sử dụng dưới lúc dùng Mifestad khoảng tầm hai ngày. Thuốc có tác dụng dẫn đến thắt chặt tử cung cũng như tống mô thai ra bên ngoài trong khoảng một ngày Tiếp đó.

## Hữu hiệu của thuốc bỏ thai

Hiệu của của biện pháp kết thúc thời kỳ thai nghén bằng thuốc phụ thuộc vào khoảng thời gian mang thai (tuổi thai) khi lấy thuốc. Tìm hiểu tỷ lệ thành quả theo độ tuổi thai cho hiệu quả như sau:

- Độ tuổi thai 8 tuần trở xuống thì có tỷ lệ thành công là 94-98%, có nghĩa là cứ 100 người sử dụng thuốc phá thai sẽ liệu có tầm khoảng 94-98 cơ thể ra thai cũng như 2-6 người không ra thai;
- Độ tuổi thai 8-9 tuần có tỷ lệ thành công là 94-96%;
- Độ tuổi thai 9-10 tuần liệu có số trường hợp thành công là 91-93%;
- Độ tuổi thai 10-11 tuần liệu có tỷ lệ thành công là 87%.

“Trong một số tình huống sử dụng thuốc chấm dứt thai kỳ tuy vậy không ra thai, chị em phụ nữ sẽ được siêu âm thăm khám. Nếu mà thai vẫn còn trong tử cung sẽ can thiệp hút thai ra phía ngoài nhằm rửa ráy tử cung”, bác sĩ Khánh Quyên cho rằng.

## Nên chuẩn bị các gì khi dùng thuốc bỏ thai?

Trước lúc tiến hành bỏ thai bằng thuốc, chị em phụ nữ cần sắp các điều sau: (4)

- Thăm khám tính mệnh để được đánh giá hiện tượng tính mệnh tổng thể thì có không thiếu điều kiện làm cách hoặc không, loại trừ một số tình huống chống chỉ định; định vị độ tuổi thai nhi và hiện tượng bào thai ở trong hay ngoài tử cung. Bên cạnh đó, chị em phụ nữ sẽ được bác sĩ trả lời cận kề phác đồ tiến hành, các tai biến có thể diễn ra cũng như lưu ý dưới khi sử dụng thuốc phá thai.
- Chuẩn bị tính mạng tốt bằng giải pháp nằm nghỉ phù hợp, có khẩu phần ăn uống phù hợp, cho thêm đầy đủ dưỡng chất, nhất là thực phẩm giàu sắt do dưới phá thai nữ giới thường bị thiếu máu.
- Chuẩn bị tâm sinh lý tốt, tránh lo lắng, lo sợ quá độ. Tốt hơn hết nên thì có người thân trong nhà đi cùng nhằm giúp sức tâm lý, cùng với phục vụ phái đẹp sau lúc phá thai.

## **Phác đồ tiến hành phá thai bằng cách uống thuốc**

Phác đồ chấm dứt thai bằng thuốc đang được tiến hành tại trung tâm phụ khoa, phòng khám chuyên khoa Tâm Anh TP.HCM như sau:

- Khi thì có quyết định bỏ thai, phái đẹp đến kiểm tra ở trung tâm để được bác sĩ chuyên khoa sản phụ khoa hỏi thăm bệnh sử, tiền sử, quan sát liệu có căn bệnh chống chỉ định hoặc không. Nữ được xét nghiệm tổng thể, thăm khám phụ khoa, siêu âm xét nghiệm bào thai bao nhiêu tuần, có bao nhiêu thai trong buồng tử cung và vị trí của thai.
- Lúc liệu có kết trái siêu âm, chuyên gia sẽ tư vấn biện pháp phá thai khoa học. Nếu như phái đẹp chọn phá thai bằng thuốc, bác sĩ sẽ tư vấn tỷ lệ thành công, quá trình làm cùng với một số biểu hiện có nguy cơ diễn ra lúc uống thuốc. Nếu như cho phép làm, chị em phụ nữ sẽ được ký cam kết phá thai tự nguyện.
- Sau khi ký đơn cam kết, chị em phụ nữ được chỉ dẫn gây một vài xét nghiệm cơ bản xem xét thì có thỏa cơ hội phá thai hoặc không, đặc biệt là kiểm tra máu nhằm coi nhóm máu, có đúng nhóm máu hiếm không, liệu có bị đông máu hoặc khả năng mất máu hoặc không... Nếu mà thỏa một số cơ hội, chị em phụ nữ sẽ được chỉ định sử dụng thuốc bỏ thai đúng quá trình.

Chị em phụ nữ sẽ được dùng thuốc tại căn bệnh viện:

- Liều đầu tiên là viên Mifestad hàm lượng 200mg thì có công dụng khiến cho thai ngưng phát triển. Phải đợi được đề nghị quan sát tại bệnh viện tầm 30 phút – 1 giờ đồng hồ. Nếu mà chưa có dấu hiệu nhận biết không bình thường, phụ nữ sẽ được về nhà cùng với hứa hẹn 2 ngày dưới tái phát bệnh viện công lập nhằm uống liều tiếp theo.
- Liều tiếp theo là Misoprostol hàm số lượng 200mcg có tác dụng gây ra thụt thắt dạ con cũng như tống thai ra ngoài. Dưới lúc uống thuốc quan sát ở bệnh viện công lập khoảng tầm 30 phút – một giờ đồng hồ. Nếu chưa có triệu chứng thất thường, nữ sẽ được về nhà.

Quan sát hữu hiệu sau lúc sử dụng thuốc phá thai như sau:

- Sau dùng thuốc sẽ ra huyết "cô bé" nhiều như khi đến những ngày kinh nguyệt, Đó là dấu hiệu phá thai thành công. Nữ vĩnh viễn yên tâm bởi vì lúc ra túi thai thì hiện tượng ra huyết sẽ khỏi. Cần phải tái thăm khám để được siêu thanh lòng tử cung có sạch sẽ hoặc không, khẳng định kết quả phá thai thành tựu.

## **Phản ứng phụ có khả năng gặp phải dưới lúc sử dụng thuốc phá thai**

Bác sĩ chuyên khoa Khánh Quyên cho biết, dưới khi phá thai nội khoa, Nếu như phụ nữ bị dị ứng với một số thành phần của thuốc có nguy cơ thấy tình trạng mọc mề đay, mệt, ngứa... Nếu mà tình trạng nặng có khả năng gây nên khó khăn thở, mắ choáng hoặc mắ phù.

Trong khi sử dụng thuốc có khả năng mắ phải các phản ứng phụ như mốt nôn, tiêu chảy hoặc nhức đầu, Nếu chỉ là dấu hiệu thoáng qua thì không cần chữa trị. Nếu như bị đau bụng, nữ có thể lấy thuốc giảm đau đốn Paracetamol Nếu không mắ dị ứng. Nếu bị ớn lạnh thì phải sử dụng áo ấm, uống nước nóng nhằm giảm bớt dấu hiệu nhận biết.